

22. Was trifft auf die Bauchspeicheldrüse zu?

1. Der Bauchspeicheldrüsenkopf liegt in der C-Schlinge des Krummdarms
2. Der Bauchspeicheldrüsen Schwanz liegt am Nierenhilus
3. Der Bauchspeicheldrüsenkörper überquert die Wirbelsäule in Höhe Th7 - Th8
4. Die Bauchspeicheldrüse wiegt in etwa 80 - 90 g
5. Die Bauchspeicheldrüse ist ungefähr 8 - 10 cm lang

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussage 4 ist richtig

23. Welche Symptome sind beim Pankreas-Karzinom möglich?

1. Oberbauchbeschwerden
2. Gewichtszunahme
3. Ikterus
4. Gallenblase schmerzlos zu fühlen
5. Leistungsminderung, Schwäche

- A) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

24. Welche Aussagen zur akuten Pankreatitis sind richtig?

1. Tiefe Oberbauchschmerzen, die in den Rücken ausstrahlen
2. Teerstühle
3. Schocksymptome
4. Meteorismus
5. Schmerzen sind typisch kolikartig

- A) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

25. Husum: Folgende Aussage(n) zum Pankreaskarzinom ist/sind richtig:

- A) Das Courvoisier-Zeichen kann auf einen Pankreastumor hinweisen
- B) Ikterus kann Frühzeichen eines Pancreastumors sein
- C) Bei unerklärlichen (wiederholten) Thrombosen ist auch an ein Pankreaskarzinom zu denken
- D) A und B sind richtig
- E) A, B und C sind richtig

26. Husum: Mögliche (r) Auslöser einer akuten Pankreatitis ist/sind:

- A) Hoher Alkoholkonsum
- B) In der Vaterschen Papille eingeklemmter Gallenstein
- C) Dickdarmspiegelung
- D) Nur die Aussagen A und B sind richtig
- E) A, B und C sind richtig

22. Die Lösung E ist richtig.

Zu 1 : Der Pankreaskopf liegt in der C-Schlinge des Zwölffinger darms (Duodenum)

Zu 2: Der Pankreasschwanz liegt am Milzhilus

Zu 3: Der Pankreaskörper überquert die Wirbelsäule in Höhe des I. Und 2. Lendenwirbels

Zu 4: Die Bauchspeicheldrüse wiegt tatsächlich in etwa 80-90 g

Zu 5: Die Bauchspeicheldrüse kann niemals nur 8-10 cm lang sein, sie durchquert den ganzen Bauchraum und ist etwa 15 bis 20 cm lang

23. Die Lösung A ist richtig.

Ein Pankreas-Karzinom ist zu 70% im Kopfbereich der Bauch speicheldrüse lokalisiert, findet sich am häufigsten im 6. Lebensjahrzehnt, metastasiert sehr früh und ist gekennzeichnet durch schwierige Diagnose, schwierige Therapie und schlechte Prognose.

Mögliche Symptome: Schmerzen im Oberbauch und in den Rücken, Appetitlosigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Gewichtsabnahme, evtl. Ikterus durch Verdrängung der Gallen gänge mit Verlegung der Vaterpapille, Courvoisier-Zeichen vor handen = Galle prallelastisch und schmerzlos tastbar als Folge einer Verlegung des Duktus Choledochus durch den Tumor

24. Die Lösung C ist richtig.

Symptomatik akute Pankreatitis: Heftige Oberbauchschmer zen, die nach allen Seiten ausstrahlen können (DD: Herzinfarkt), meist gürtelförmig und in den Rücken (Pankreasschon haltung = beim Vorwärtsbeugen lassen die Schmerzen nach), Übelkeit und Erbrechen, Fieber, paralytischer Ileus, Meteorismus, elastische Bauchdeckenspannung (Gummibauch), Aszites, Ikterus, Schockzeichen, Pleuraerguß, Gesichtsrötung, EKG-Ver änderungen, evtl. als Oberbauchtumor palpabel

Zu 2: Normalerweise keine Teerstühle, es kann bei schwerer hämorrhagischer Pankreatitis zu Blutungen in das Gewebe kommen

Zu 5: Typisch ist der Dauerschmerz

25. Husum 1: Aussage E ist richtig**26. Husum2 : Aussage D ist richtig**